

Humilat grow efektivitāte cīņā pret lauksaimniecības kultūru slimībām.

Lietojot līdzekli kā nespecifiskās darbības fungicīdu un imūnstimulatoru, tiek uzlabota augu veselība un palielināta specifiskās darbības augu ārstniecības līdzekļu efektivitāte.

Graudaugu kultūras

- ✓ KVIEŠI, MIEŽI - invāzijas samazināšanās:
 - ar miltrasu 2-3 reizes;
 - ar sakņu puvi par 70%;
 - ar septoriozi un fuzariozi par 60-70%.

- ✓ KUKURŪZA - invāzijas samazināšanās:
 - ar melpauku par 30-40%;
 - ar ziemeļu helmintosporiozi par 40-60%;
 - ar rūsu par 70%.

- ✓ AUZAS - invāzijas samazināšanās:
 - ar vaināgrūsu par 65-70%;
 - ar miltrasu par 60-70%;
 - ar sakņu puvi par 65-70%;

- ✓ ZIRŅI - invāzijas samazināšanās:
 - ar miltrasu par 50%;
 - ar rūsu par 50%.

Tehniskās kultūras

- ✓ SAULESPUKĶES - invāzijas samazināšanās:
 - ar peronosporozi 1,5 reizes;
 - ar pelēku, baltu un pelnu puvi 2,8 reizes;
 - ar sauso groziņu puvi 1,6 reizes;
 - ar verticelozi 2,2 reizes;
 - ar rūsu 2 reizes;
 - ar fomozi 1,8 reizes;

- ✓ CUKURBIETES - invāzijas samazināšanās:
 - ar cercosporozi 2-3,5 reizes;
 - ar peronosporozi 1,7 reizes;
 - ar miltrasu 2,5 reizes;
 - ar rūsu 1,7 reizes;
 - ar fomozi 1,6 reizes;
 - ar serdes puvi 1,3 reizes;
 - ar dīgstu puvi 1,5 reizes;

Dārzeņu kultūras

- ✓ TOMĀTI - invāzijas samazināšanās:
 - ar fitoftorozi 1,4-2,9 reizes;
 - ar alternariozi 1,6-2,9 reizes;
 - ar septoriozi 1,4-2 reizes;
 - ar bakteriālo melnplankumainību 1,5-2 reizes.

- ✓ GURĶI - invāzijas samazināšanās:
 - ar peronosporozi 2 reizes;
 - ar bakteriozi 2 reizes;
 - ar miltrasu 1,9 reizes;
 - ar vīti 1,5 reizes;

- ✓ KARTUPEĻI - invāzijas samazināšanās:
 - ar fitoftorozi 3-6,6 reizes;
 - ar makrosporiozi 3,3 - 12,5 reizes;
 - ar vīti 2,7-3,6 reizes;
 - ar kraupi par 40-50%;
 - ar slapju trupi par 60-70%.

- ✓ SĪPOLI (uz sēklām) - invāzijas samazināšanās:
 - ar peronosporozi par 45-80%.

- ✓ SĪPOLI (uz sīpoliņiem) - invāzijas samazināšanās:
 - ar peronosporozi 3,4 reizes;

Augļu-ogu kultūras

- ✓ ĀBELE - invāzijas samazināšanās:
 - ar kraupi par 40-50%;

- ✓ VĪNOGULĀJI - invāzijas samazināšanās:
 - ar neīsto miltrasu 1,6-2,3 reizes;
 - ar īsto miltrasu 2 reizes;
 - ar pelēku un baltu puvi 2,3 reizes;
 - ar antraknozi 3 reizes.